

Com reconèixer la vespa asiàtica

La vespa asiàtica és una espècie invasora i és important aprendre a distingir-la de les espècies autòctones.

La vespa asiàtica ha estat erròniament anomenada "assassina" en informacions o campanyes a alguns mitjans de comunicació, fet que ha creat certa alarma social. Aquesta vespa no és més agressiva envers els humans que altres espècies de vespes.

La seva importància recau en l'impacte ecològic ocasionat per la depredació d'insectes autòctons, especialment de les abelles, un dels insectes pol·linitzadors més importants.


Tot i això, igual que amb la resta de vespes, no s'han de molestar ni intentar capturar-les quan estiguin a prop, i tampoc ens hem d'acostar al seu niu (a menys de 5 metres) per a què no se sentin amenaçades.

En el cas de ser al·lèrgic, s'ha d'anar amb molta més precaució, igual que es faria per la vespa comuna o per picades d'altres insectes.

Vespa velutina



Espècies autòctones



Trampes casolanes

No es aconsellable l'ús de trampes casolanes perquè poden causar danys a la biodiversitat.

Aquestes trampes no solen ser gaire específiques, capturen tot tipus d'insecte de la nostra fauna autòctona, i si s'utilitzen a principis de primavera poden arribar a fer més mal que bé.

Sí que pot ser útil un bon trampeig realitzat per professionals.



Més informació
santcugat.cat/vespa-asiatica

La vespa asiàtica

Què hem de saber?



AJUNTAMENT DE
SantCugat

Com diferenciar el niu

La vespa asiàtica fa dos tipus de nius segons l'època de l'any:

Niu primari: nius petits de forma arrodonida que poden aparèixer en façanes, cornises de teulades, garatges, porxos, entresolats, contenidors... normalment en zones arrecerades que els serveixen de refugi. Presenten l'orifici d'entrada a la part inferior.



Niu secundari: niu de mida gran, que pot arribar a fer més de 60 centímetres de diàmetre, amb forma ovalada.

Solen trobar-se a grans alçades, en arbres o teulades, a uns 30 metres. Rarament poden estar localitzats a nivell del sòl. Presenten l'orifici d'entrada a la zona lateral.



Què fer en cas que detectem un niu

Via pública. En cas que trobeu un niu a Sant Cugat al carrer o a un parc, ja sigui primari o secundari, cal apuntar bé el lloc i data de la troballa i fer un avís a l'Ajuntament a través d'Ulls de la ciutat.

Espais privats. En cas que trobeu un niu en el vostre entorn privat (habitatge, jardins particulars, parterres comunitaris, etc.), caldrà que contacteu una empresa de control de plagues especialitzada.

S'ha de tenir en compte que les vespes obreres poden desplaçar-se kilòmetres per a buscar aliment. En cas de veure exemplars individuals no és segur que hi hagi un niu al costat.


Què fer si rebem una picada

Les picades d'aquesta vespa són similars a les de les vespes comunes. Poden ser una mica més doloroses perquè el fibló és més gran, però no contenen un verí més nociu. Igual que en el cas de picada d'una vespa comuna, es poden seguir les recomanacions tradicionals: **rentar bé la zona de la picada amb sabó antisèptic, aplicar alguna pomada analgèsica o altres remeis naturals que calmin la coïssor.**



Cicle vital de la vespa asiàtica

La presència de nius no significa necessàriament que hi hagi vespes, cal tenir en compte el seu cicle vital.



- 1 Febrer-març**
Les reines comencen la construcció de nous nius primaris.
De desembre a gener, hibernació de les noves vespes reines fora dels nius, a forats a terra, als arbres o roques.
- 2 Abril-maig**
Neixen les vespes obreres.
Continuen la construcció del niu.
- 3 Juny-juliol**
Augmenta el nombre d'individus.
El niu es trasllada a una ubicació més alta.
Durant l'estiu, el niu secundari i la colònia es segueixen desenvolupant.
- 4 Setembre-octubre**
El niu assoleix la màxima grandària.
Comença la fecundació de noves reines.
Al final de la tardor, les noves reines abandonen el niu. La reina inicial i les obreres hi romanen fins a la seva mort.